

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Desitin - Salbe

Wirkstoffe: Lebertran und Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3-5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Desitin - Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Desitin - Salbe beachten?
3. Wie ist Desitin - Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Desitin - Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DESITIN - SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Desitin - Salbe ist eine Wund- und Heilsalbe, welche als Wirkstoffe Lebertran und Zinkoxid enthält. Der enthaltene Lebertran ist reich an Vitamin A und ungesättigten Fettsäuren und bewirkt somit eine Anregung der Gewebsneubildung. Zinkoxid besitzt desinfizierende und aufsaugende Eigenschaften.

Anwendungsgebiete:

Zur Unterstützung der Wundheilung bei oberflächlichen entzündlichen Hauterkrankungen (z.B. nässende Entzündungen im Bereich der Körperfalten, Hautirritationen in der Windelregion) sowie bei leichten Verbrennungen (z.B. leichter Sonnenbrand).

Wenn Sie sich nach 3-5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DESITIN - SALBE BEACHTEN?

Desitin - Salbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Lebertran, Zinkoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Desitin – Salbe anwenden.

Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden.

Vor der Anwendung der Salbe muss eine Infektion der Wunde (z.B. Wunde ist eitrig) ausgeschlossen werden. Falls eine Wundinfektion auftritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung von Desitin - Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die gleichzeitige Anwendung von Desitin - Salbe und anderen äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln (wie antibiotika-, dithranol- oder salicylsäurehaltigen Arzneimitteln) auf den selben Hautstellen kann deren Wirkung beeinträchtigen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stellen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Desitin - Salbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden, eine großflächige Anwendung ist jedoch zu vermeiden.

Während der Stillzeit darf Desitin - Salbe nicht auf der Brust aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

DESITIN - SALBE Desitin - Salbe enthält Cetylalkohol, Stearylalkohol und Wollwachs (Lanolin)

Diese Inhaltsstoffe können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST DESITIN - SALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut.

Desitin - Salbe mehrmals täglich messerrückendick direkt auf die betroffenen Hautpartien oder auf sauberen Verbandstoff auftragen und auf die zu behandelnde Wundfläche auflegen. Die Wundränder sollen fingerbreit überdeckt sein.

Salbenreste in der Umgebung der Wunde können mit Wundbenzin oder reinem Pflanzenöl entfernt werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten):

- Allergien mit Hautausschlag. In solchen Fällen ist Desitin - Salbe nicht weiter zu verwenden.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Vorübergehende Veränderung der Hautfarbstoffe durch Zinkoxid.

- Vorübergehende Hautschuppungen bei länger dauernder Anwendung durch das in Lebertran enthaltene Vitamin A.
- Lokale Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) sowie Reizung der Augen und Schleimhäute hervorgerufen durch einige Bestandteile von Desitin - Salbe.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST DESITIN - SALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen der Tube 3 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was DESITIN - SALBE Desitin - Salbe enthält:

Die Wirkstoffe sind: Lebertran und Zinkoxid

100 g Salbe enthalten:	13 g Lebertran
	30 g Zinkoxid

Die sonstigen Bestandteile sind: Vaseline weiß, Paraffinum solidum, Eucerinum anhydricum, Wollwachs (Lanolin), Talcum, Methylsalicylat und gereinigtes Wasser.

Wie Desitin - Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Nahezu weiße bis ganz schwach gelbe Salbe mit leichtem Geruch nach Lebertran.

Aluminium-Tuben mit 20 g oder 50 g Salbe.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH

Leystraße 129

A-1200 Wien

Hersteller

MoNo chem-pharm Produkte GmbH
Leystraße 129
A-1200 Wien

Zulassungsnummer
2111

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2017.