

# Lefaxin® Kautabletten



## Bei Blähungen und Völlegefühl

### Eigenschaften:

- Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder über 2 Jahren
- Wirkstoff wirkt lokal und wird nicht resorbiert
- Rasche Beschwerdefreiheit – erleichtert und beseitigt das Spannungsgefühl des geblähten Bauches

### Status:

Rezeptfreies Arzneimittel

### Wirkstoff:

Simethicon (42 mg)

### Anwendungsgebiete:

- Übermäßige Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich mit Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl und Spannungsgefühl im Oberbauch
- Verstärkte Gasbildung nach Operationen sowie dem Roemheld-Syndrom
- Zur Vorbereitung des Magen-Darm-Bereichs für diagnostische Untersuchungen

### Dosierung:

*Behandlung von Blähungen und Völlegefühl:*

1 – 2 Tabletten werden 3 mal täglich zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen. Bei Bedarf können auch vor dem Schlafengehen noch 1 – 2 Tabletten eingenommen werden.

*Zur Vorbereitung bildgebender diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich:*

Am Tag vor der Untersuchung werden von Erwachsenen nach jeder Mahlzeit und am Morgen des Untersuchungstages 2 – 3 Tabletten eingenommen.



L.AT.MKT.06.2017.6176

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt, oder Apotheker.