

Tasectan[®] DUO

Anwendungsbereich

Tasectan DUO dient dazu, die physiologischen Funktionen der Darmwand wiederherzustellen sowie Störungen des Gleichgewichts der Bakterienflora des Darmtraktes (Dysbakterie) verschiedener Art und unterschiedlicher Ursache vorzubeugen und zu lindern.

Es ist vorgesehen zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Durchfall und anderen damit zusammenhängenden Symptomen wie Blähungen und Bauchschmerzen. Diese können u.a. auch als Folge entzündlicher Darmerkrankungen, der Einnahme von Antibiotika, Chemotherapie u.ä. auftreten. Tasectan DUO wirkt innerhalb von 12 Stunden. Dieses Medizinprodukt trägt dazu bei, die optimale Darmfunktion wiederherzustellen, das Wachstum der endogenen Darmflora anzuregen und somit zu einer Verbesserung der natürlichen Abwehr des Organismus beizutragen.

Packungen

Zwölf Beutel mit Pulver für Kinder.

Blisterpackung mit zwölf Tabletten für Erwachsene.

Zusammensetzung

Pulver für Kinder: 250 mg Gelatinetannat (porcinen Ursprungs), tyndallisierte Milchsäurebakterien.

Tabletten: 500 mg Gelatinetannat (porcinen Ursprungs), tyndallisierte Milchsäurebakterien, Calciumphosphat, mikrokristallines gefälltes Silicium, Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs), Croscarmellose-Natrium, Polyvinylpyrrolidone, Hydroxypropylmethylcellulose, Titandioxid, mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Indigocarmin E 132 und Indigocarmin Aluminiumgel, pflanzliches Glycerin.

Verwendete Bakterienstämme: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus.

Anwendungshinweis

Pulver: Der Inhalt eines Beutels muss mit einer kleinen Menge Milch, Obstsaft oder Wasser vermischt und sofort eingenommen werden. Er kann auch mit Joghurt oder einem anderen Lebensmittel eingenommen werden.

Das Medizinprodukt nicht direkt ohne Vermischen einnehmen.

Tabletten: Tablette mit Flüssigkeit schlucken.

Dosierung

Kinder unter 3 Jahren: 1 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Kinder zwischen 3 und 14 Jahren: 1 oder 2 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Erwachsene und Kinder über 14 Jahre: 1 bis 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Warnhinweise

- » Es ist nicht erforderlich, vor der Anwendung des Medizinprodukts eine medizinische Fachkraft zu konsultieren. Im Falle von heftigeren oder anhaltenden Symptomen oder wenn Zweifel bezüglich der Diagnose bestehen, sollte eine medizinische Fachkraft konsultiert werden.
- » Im Falle von Durchfall bei Kindern unter 3 Jahren und älteren Menschen sollte eine medizinische Fachkraft konsultiert werden, vor allem bei Vorhandensein von weiteren Symptomen.
- » Dieses Medizinprodukt ist kein Arzneimittel. Wenn eine derartige Behandlung von einer medizinischen Fachkraft empfohlen wird, kann das Medizinprodukt gleichzeitig dazu eingenommen werden.
- » Es wird empfohlen, reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen sowie die bei Durchfallerkrankungen üblichen diätetischen Maßnahmen anzuwenden.
- » Zwar sind keine Nebenwirkungen bekannt, doch sollte das Medizinprodukt nicht in Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden, außer wenn es von einer medizinischen Fachkraft verordnet wird.
- » Das Medizinprodukt nach dem auf der Packung aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- » Das Medizinprodukt nicht verwenden, wenn die Blisterpackung oder die Beutel geöffnet oder beschädigt sind.
- » Dieses Medizinprodukt erfordert keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen. Nicht einfrieren.
- » Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Tasectan DUO darf nicht von Patienten eingenommen werden, die eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Gelatinetannat oder einen anderen Inhaltsstoff haben.

Rev.03: 02.05.2017



NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona, Spanien

Vertrieb

Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam (Österreich)

106609-2

7FGI00121001

CE
0373