

Zutaten pro Kapsel:
Kapselhülle: Cellulose.

101128

Nettofüllmenge: 100 g e

Anwendung:

Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich je 3 Kapseln zu den Mahlzeiten mit einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.

Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden Belastungen gegeben sind.

MED THERAPY PRO

Erhöht die Verträglichkeit
medikamentöser Therapien



200 Kapseln



HERGESTELLT IN ÖSTERREICH

PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5
A-9585 Gödersdorf, Villach, Austria

PANACEO

Erhöht die Verträglichkeit medikamentöser Therapien durch die Stärkung der Darmwand-Barriere. Durch die Sanierung der verletzten Darmwand (Leaky-Gut) trägt THERAPY PRO zur Verbesserung des Allgemeinzustandes und der Entzündungs-, Blut- und Leberwerte bei.

Natur-Medizinprodukt

PANACEO MED THERAPY-PRO ist ein natürliches Medizinprodukt, das als Kationentauscher im Magen-Darm-Trakt wirkt und selektiv definierte Schadstoffe binden und ausleiten kann. Der Wirkstoff im PANACEO MED THERAPY-PRO ist der optimierte PMA-Zeolith. Die PMA Technologie (Panaceo Mikro Aktivierung) ist patentiert und die Einzigartigkeit des PMA-Zeolith sowie seine ausgelobte Wirkung ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist bekannt, dass unterschiedliche Stressoren, insbesondere medikamentöse (z.B. onkologische Therapien) und physische Belastungen zu einer Störung der Darmwand-Barriere (Leaky-Gut) führen können. Durch die erhöhte Permeabilität gelangen vermehrt Fremdstoffe und Endotoxine aus dem Darm in den Blutkreislauf. Mögliche Symptome im Zusammenhang mit „Leaky-Gut“ sind z.B. erhöhte Entzündungs- und Leberwerte, unspezifische Müdigkeit bzw. ein schlechter Allgemeinzustand. Wir empfehlen die Abklärung der Symptome mit dem Arzt Ihres Vertrauens.

(Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Innenseite).

www.panaceo.com

Chargennummer & Ablaufdatum siehe Dosenboden

9
PZN – 5228506



CE 0477

Hier öffnen

Die Einnahme ist für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen.

Sicherheitshinweise

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine Nebenwirkungen bekannt. Dies ist insbesondere bei Vorliegen von chronischer Verstopfung zu beachten.

Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken.

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, empfehlen wir eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von PANACEO MED THERAPY-PRO mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem Zeolith eingenommen werden sollten.

Informieren Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten Ihren Arzt, da PANACEO MED THERAPIE-PRO als Nebeneffekt die körpereigene Immunaktivität erhöhen kann.

Da noch keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) sowie Schwangeren und Stillenden nicht empfohlen werden.

Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen.



Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.

101128
Gebrauchsanweisung gültig ab: **Februar 2021**