

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

ilon Classic Salbe

Wirkstoffe: Eukalyptusöl, Lärchenterpentin, Terpentinöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ilon Classic und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ilon Classic beachten?
3. Wie ist ilon Classic anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ilon Classic aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist ilon Classic und wofür wird es angewendet?

ilon Classic ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung leichter, lokal begrenzter, eitriger Entzündungen der Haut, wie z. B. Eiterknötchen, entzündete Haarbälge und Schweißdrüsenentzündungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

ilon Classic wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ilon Classic beachten?

ilon Classic darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Eukalyptusöl, Lärchenterpentin, Terpentinöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- bei Kindern unter 30 Monaten, da die Gefahr besteht, dass 1,8-Cineol-haltige Zubereitungen, wie Eukalyptusöl oder andere ätherische Öle, einen Laryngospasmus (Stimmritzenkrampf) auslösen können.
- bei Kindern mit Krämpfen (mit oder ohne Fieber) in der Vorgeschichte.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie ilon Classic anwenden.

Wenn sich Ihre Hautentzündung verschlimmert (Zunahme von Rötung, Schwellung oder Schmerz) oder sich Ihr Allgemeinzustand verschlechtert oder wenn nach 3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Tragen Sie ilon Classic nicht auf Schleimhäute, offene Wunden oder Hautausschläge auf.

Waschen Sie sich nach dem Auftragen der Salbe bitte gründlich die Hände.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren ist aufgrund unzureichender Daten nicht belegt.

Darf bei Kindern unter 30 Monaten oder bei Kindern mit Krämpfen (mit oder ohne Fieber) in der Vorgeschichte nicht angewendet werden; siehe „ilon Classic darf nicht angewendet werden“.

Anwendung von ilon Classic zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Es wurden keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln beschrieben.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht nachgewiesen.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen wird die Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

ilon Classic enthält Butylhydroxytoluol (E 321)

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

3. Wie ist ilon Classic anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren:

Einmal täglich einen 2-3 cm langen Salbenstrang von ilon Classic auf den entzündeten Hautbereich auftragen.

Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Vor dem Auftragen der Salbe ist der entzündete Hautbereich sorgfältig zu reinigen, vorzugsweise mit Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel. Dabei ist jeglicher Druck auf die Entzündungsstelle zu vermeiden. Je nach Ausdehnung des entzündeten Gewebereichs einen 2-3 cm langen Salbenstrang auf den betroffenen Bereich auftragen und diesen mit einem Verband abdecken.

Der Verband sollte täglich gewechselt werden.

Dauer der Anwendung

Für ein erfolgreiches Behandlungsergebnis kann es erforderlich sein, ilon Classic mindestens 3 Tage lang anzuwenden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren ist aufgrund unzureichender Daten nicht belegt.

Dieses Arzneimittel darf bei Kindern unter 30 Monaten oder bei Kindern mit Krämpfen (mit oder ohne Fieber) in der Vorgeschichte nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von ilon Classic angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von ilon Classic vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können lokale allergische Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) und systemische allergische Reaktionen auftreten, die nach Absetzen der Behandlung abklingen. Die Häufigkeit solcher Reaktionen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist ilon Classic aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für das ungeöffnete Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach Anbruch der Tube nicht über 25 °C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube nach „Verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch der Tube: 6 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ilon Classic enthält

- Die Wirkstoffe sind:

1 g Salbe enthält:

12 mg *Eucalyptus* sp., aetheroleum (Eukalyptusöl)

54 mg *Larix decidua* Mill., balsamum (Lärchenterpentin)

72 mg *Pinus pinaster* Aiton und/oder *Pinus massoniana* D. Don., aetheroleum (Terpentinöl)

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Weißes Vaseline, Gelbes Wachs, Stearinsäure 50, Ölsäure, Polysorbat 20, Rosmarinöl, Thymianöl vom Thymol-Typ, Thymol, Chlorophyll-Kupfer-Komplex (E 141), Butylhydroxytoluol (E 321, enthalten in Terpentinöl).

Wie ilon Classic aussieht und Inhalt der Packung

ilon Classic ist eine hellgrüne, transparente, homogene Salbe mit charakteristischem Geruch nach ätherischen Ölen und Terpentinöl.

ilon Classic ist in beschichteten Aluminiumtuben mit 25 g, 50 g und 100 g Salbe erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Cesra Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20
76532 Baden-Baden
Deutschland

Tel. +49 (0) 72 21 9 54 00
Fax +49 (0) 72 21 5 40 26
E-Mail cesra@cesra.de

Vertrieb

Synpharma GmbH
Postfach 4
Wiener Bundesstraße 21
5300 Hallwang bei Salzburg
Österreich

Tel. +43 (0) 662 661375
Fax +43 (0) 662 661941
E-Mail info@Synpharma.at

Reg. Nr.:

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Österreich: ilon[®] Classic Salbe
Griechenland: ilon[®] Classic
Litauen: ilon[®]

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2021.