

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus 0,5 mg/ml - Nasenspray

Wirkstoff: Oxymetazolinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus Nasenspray jedoch ordnungsgemäß angewendet werden.

- **Heben Sie die Packungsbeilage auf.** Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus beachten?
3. Wie ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus und wofür wird es angewendet?

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus ist ein Nasenspray zur lokalen Linderung der Beschwerden einer verstopften Nase in Verbindung mit einer Erkältung oder Rhinitis (Schnupfen) bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Die Wirkung des Sprays beginnt nach einigen Minuten und hält bis zu 12 Stunden an.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus beachten?

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus darf nicht angewendet werden, wenn Sie

- allergisch gegen Oxymetazolinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Monoaminoxidasehemmer einnehmen oder in den letzten zwei Wochen eingenommen haben (MAO-Hemmer werden zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit und Depression verwendet).
- an einer akuten Herzerkrankung oder Herzasthma leiden.
- an erhöhtem Augendruck (Engwinkelglaukom) leiden.
- sich einer Operation zur Entfernung Ihrer Hirnanhangsdrüse unterzogen haben.
- an einer Entzündung der Haut oder der Schleimhäute Ihrer Nasenlöcher leiden oder Krusten in Ihrer Nase haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus anwenden, falls Sie an

- Bluthochdruck
- ischämischer Herzerkrankung inkl. Angina pectoris
- Diabetes
- Schilddrüsenproblemen
- Prostatavergrößerung (Prostatahypertrophie)
- erhöhtem Augeninnendruck
- Phäochromozytom (einem seltenen Tumor der Nebenniere)

leiden.

Anwendung von Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

- **Monoaminoxidasehemmer** (MAO-Hemmer) werden zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit und Depression verwendet. Sie dürfen Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus Nasenspray **nicht anwenden**, wenn Sie MAO-Hemmer in den letzten zwei Wochen eingenommen haben.
- **Trizyklische Antidepressiva** - informieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen einnehmen, wie z.B. Amitriptylin und Imipramin
- **Betablocker oder andere blutdrucksenkende Mittel** - informieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund unzureichender Information zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit soll Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus nur auf Anraten eines Arztes angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus enthält Benzalkoniumchlorid und Benzylalkohol

Dieses Arzneimittel enthält 0,01 mg Benzalkoniumchlorid pro Sprühstoß, entsprechend 0,2 mg/ml. Benzalkoniumchlorid kann eine Reizung oder Schwellung der Nasenschleimhaut hervorrufen, insbesondere bei längerer Anwendung.

Dieses Arzneimittel enthält 0,1 mg Benzylalkohol pro Sprühstoß, entsprechend 2 mg/ml. Benzylalkohol kann allergische Reaktionen und/oder leichte lokale Reizungen hervorrufen.

3. Wie ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Kinder über 10 Jahre: 1 - 2 Sprühstöße in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3-mal täglich.

Kinder von 6 - 10 Jahren: 1 Sprühstoß in jede Nasenöffnung, höchstens 2 - 3-mal täglich.

Dieses Arzneimittel ist nicht für Kinder unter 6 Jahren bestimmt. In dieser Altersgruppe sind Arzneimittel mit einem niedrigeren Gehalt an Oxymetazolin anzuwenden.

Nicht länger als 7 Tage ununterbrochen anwenden und die empfohlene Dosis nicht überschreiten. Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum oder bei Überdosierung kann Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus eine verstopfte Nase verursachen und die Wirksamkeit des Arzneimittels verringern.

Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nicht bessern.

Art der Anwendung

1. Verschlusskappe abnehmen. Vor der ersten Anwendung muss die Pumpe entlüftet werden, indem Sie den Rand des Sprühaufsatzes mehrmals fest herunterdrücken, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt (ungefähr 5- bis 10-mal). Flasche aufrecht halten und den Sprühaufsatz in das Nasenloch halten.
2. Das andere Nasenloch zuhalten, siehe Abbildung 1.
3. Sprühen und gleichzeitig tief durch die Nase einatmen. Den Vorgang mit dem anderen Nasenloch wiederholen.
4. Erwachsene und Kinder über 10 Jahren können die Schritte 1 und 2 gegebenenfalls einmal wiederholen.
5. Den Sprühaufsatz mit einem sauberen, feuchten Papiertuch abwischen und die Verschlusskappe sofort nach der Anwendung wieder aufsetzen.



Wenden Sie das Produkt in aufrechter Position an.

Wenn Sie eine größere Menge Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus angewendet haben oder im Fall eines Verschluckens, sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen und die Flasche oder Verpackung mitnehmen.

Eine Überdosierung kann nach nasaler oder irrtümlicher oraler Anwendung auftreten. Symptome einer Überdosierung (bei mittlerer bis schwerer Überdosierung) können sein: Erhöhter Blutdruck, Herzrasen, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Herzstillstand, Herzversagen, Schwitzen, Erregung, Zuckungen, Erweiterung der Pupille, Übelkeit, Erbrechen, bläuliche Verfärbung der Haut oder Lippen, Fieber, Krämpfe, Kreislaufkollaps, zu viel Flüssigkeit in den Lungen, Atmungsstörungen, psychische Störungen, Schläfrigkeit, Blässe, Verengung der Pupille, Abfall der Körpertemperatur, verlangsamter Herzschlag, schockartiger Blutdruckabfall, vorübergehendes Aussetzen der Atmung, Verlust des Bewusstseins und Koma.

Wenn Sie die Anwendung von Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Anwendung laut Dosieranleitung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Im Allgemeinen sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen zu erwarten.

- **Gelegentlich** (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):
Niesen, Trockenheit oder Reizung in Nase, Mund oder Rachen, Schwellung der Nasenschleimhaut (reaktive Hyperämie) nach Abklingen der Wirkung.
- **Selten** (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):
Angstzustände, sedierende Wirkung, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Herzrasen, Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, verminderte Wirkung einer Dosis, Kopfschmerzen, Hautausschlag und Sehstörungen.
- **Nicht bekannt** (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)
Übelkeit.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

Nach Anbruch der Flasche ist dieses Arzneimittel innerhalb von 12 Monaten zu verbrauchen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus enthält

Der **Wirkstoff** ist 0,5 mg/ml Oxymetazolinhydrochlorid.

1 Sprühstoß (entsprechend 0,05 ml) enthält ca. 25 Mikrogramm Oxymetazolinhydrochlorid.

Die **sonstigen Bestandteile** sind: Sorbitol, Natriumcitrat, Polysorbat 80, Benzylalkohol, wasserfreie Citronensäure, Benzalkoniumchlorid-Lösung, Acesulfam-Kalium, Levomenthol, Cineol, Natriumedetat, Aloetrockenextrakt, Levocarvon, gereinigtes Wasser (Siehe Abschnitt 2 „Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus enthält Benzalkoniumchlorid und Benzylalkohol.“)

Wie Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus aussieht und Inhalt der Packung

Wick Nasivin Aloe & Eukalyptus ist ein Nasenspray mit Dosierpumpe.

Die Packung enthält eine Braunglasflasche mit einem weißen Pumpaufsatz.

Die Flasche enthält 15 ml Lösung.

Jede Flasche enthält mindestens 265 Sprühstöße.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

65824 Schwalbach

Deutschland

für Österreich: Tel.: 0800-201609

Hersteller

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Straße 1

64521 Groß-Gerau, Hessen

Z. Nr.: 1-24037

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien:	Nesivine Eucaliptus 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Bulgarien:	Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор
Tschechische Republik:	Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosni sprej, roztok
Estland:	Sinex
Finnland:	Vicks Sinex 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos
Deutschland:	WICK Sinex aera 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung
Ungarn:	Nasivin Aloe Vera és Eukaliptusz 0.5 mg/ml oldatos orrspray
Griechenland:	Vicks Sinex nasal spray solution 0,5 mg/ml
Litauen:	Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)
Lettland:	Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums
Niederlande:	Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Polen:	Nasivin Vicks Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Portugal:	Sinex Vapospray Aloe 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal
Rumänien:	Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
Spanien:	NasalVicks 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal
Schweden:	Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Vereinigtes Königreich

(Nordirland): Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2025.